

ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  
НЕАВТНОМНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ В МОДЕЛЯХ КОНКУРЕНЦИИ

В. Г. Ильичев

**Аннотация:** Разработан принцип наследования локальных свойств глобальным отображением Пуанкаре для неавтономных динамических систем. А именно, если свойство является равномерно локально универсальным и полугрупповым, то им обладает и глобальное отображение Пуанкаре. При исследовании глобальной динамики конкурентов в периодической среде решающую роль играет мультипликативная полугруппа так называемых знак-инвариантных матриц. Приведены геометрические критерии устойчивости равновесий (периодических решений) в моделях конкуренции.

**Ключевые слова:** универсальность, полугруппа, грубость, знак-инвариантные матрицы, конкуренция, глобальная устойчивость

Введение

При исследовании динамики неавтономных моделей с  $T$ -периодической гладкой правой частью

$$\dot{X} = F(X, t), \quad (0.1)$$

ключевую роль играет сдвиг-отображение во временном интервале  $[t, t + h]$  по траекториям системы (0.1)  $X^{t+h} = P(X^t, t, h)$ , где  $h > 0$  и  $X$  — вектор с компонентами  $(x_1, \dots, x_n)$ . Отметим специально отображение (Пуанкаре) — сдвиг за время  $[0, T]$ , которое будем записывать кратко в виде  $X^T = P(X^0)$ . Разумеется, свойства отображения Пуанкаре определяют поведение системы (0.1). Однако нахождение таких свойств представляет собой трудную задачу. Напротив, совсем просто находятся свойства аппроксимации локальных отображений (0.1):

$$X^{t+h} = L(X^t, t, h) = X^t + hF(X^t, t),$$

где  $h$  мало. Очевидно, при  $h$  фиксированном  $L$  — гладкое  $T$ -периодическое отображение  $R^n \times R$  в себя. Актуальна проблема: какие свойства локального отображения  $L$  наследуются глобальным отображением  $P$ ?

Ниже рассмотрим частную задачу о наследовании свойств  $DL$  (дифференциала  $L$ ) в  $DP$  (дифференциала  $P$ ).

---

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 00-01-00725).

### 1. Наследуемые свойства

Промежуточное положение между отображениями  $P$  и  $L$  занимают  $\pi(X, t, h)$  — локальные сдвиг-отображения за время  $[t, t+h]$  по траекториям системы (0.1) с началом в точке  $X$  при малых  $h > 0$ . Очевидно,  $L$  и  $\pi$  действуют в одном и том же фазовом пространстве. Ниже будет использована

**Лемма Адамара** (см. [1]). Пусть  $f$  — дифференцируемая (класса  $C^r$ ) функция, равная в точке  $x = 0$  нулю. Тогда  $f(x) = xg(x)$ , где  $g$  — дифференцируемая (класса  $C^{r-1}$  в окрестности точки  $x = 0$ ) функция.

Очевидно, если  $f$  — гладкая функция, то и  $g$  — гладкая функция. Представление  $f(x) = xg(x)$  справедливо для всех  $x$ .

Отметим, что из леммы Адамара вытекает соотношение

$$\pi(X, t, h) = L(X, t, h) + h^2 G(X, t, h), \quad (1.1)$$

где  $G(X, t, h)$  — некоторое гладкое отображение.

Ниже будем рассматривать «гладкие» свойства  $(\rho)$  дифференциала произвольного отображения  $Q$ , допускающего координатное представление  $(Q_1, \dots, Q_n)$ . Формально свойство  $\rho$  в точке  $(X, t)$  задается «своим» неравенством

$$\rho(DQ) = \rho(q_{11}, \dots, q_{nn}) > 0, \quad (1.2)$$

где  $\rho$  — гладкая функция от  $n^2$  аргументов;  $DQ$  — дифференциал отображения  $Q$  в точке  $(X, t)$ , задаваемый набором чисел  $q_{ij} = \partial Q_i / \partial x_j$  по всем  $i, j = 1, \dots, n$ . Например, в одномерном случае свойство

$$\rho\left(\frac{\partial Q(x, t)}{\partial x}\right) \equiv \frac{\partial Q(x, t)}{\partial x} > 0$$

означает монотонный рост  $Q$  в малой окрестности точки  $(x, t)$ .

Более конкретно, гладкое свойство  $\rho$  для дифференциала отображения  $L = L(X, t, h)$  в точке  $(X, t)$  определяется неравенством (1.2), в котором  $h$  задано и

$$q_{ij} = \frac{\partial L_i(X, t, h)}{\partial x_j},$$

а  $(L_1, \dots, L_n)$  — координатное представление  $L$ . Отметим, что

$$q_{ii} = 1 + h \frac{\partial F_i(X, t)}{\partial x_i}$$

для всех  $i$  и

$$q_{ij} = h \frac{\partial F_i(X, t)}{\partial x_j}$$

для  $i \neq j$ .

Совершенно аналогично определяется гладкое свойство и для дифференциала отображения  $\pi(X, t, t+h)$ .

Приведем полезные понятия, характеризующие гладкое свойство  $\rho$  для отображений  $DL$ ,  $D\pi$  и  $DP$  системы (0.1).

1. Пусть  $M$  — фиксированное множество из расширенного фазового пространства системы (0.1). Тогда *локальная универсальность*  $\rho$  для  $DL$  на  $M$  означает, что неравенство

$$\rho(DL) > 0$$

имеет место в каждой точке  $M$  при всех достаточно малых  $h$  ( $0 < h < \delta$ ). Формально выполнение  $\rho$  для достаточно малых  $h$  означает, что данное неравенство справедливо при всех  $0 < h < \delta$ . Разумеется, значение  $\delta$  может зависеть от  $(X, t)$ .

Далее, будем говорить, что имеет место *равномерная локальная универсальность*  $\rho$  на  $M$  для отображения  $DL$ , если удастся выбрать общую для всех  $(X, t)$  из  $M$  границу  $\delta^*$ . Например, при  $n = 1$  для всех  $(X, t)$  выполняется неравенство

$$\rho\left(\frac{\partial L}{\partial x}\right) \equiv \frac{\partial L}{\partial x} = 1 + h \frac{\partial F}{\partial x} > 0,$$

когда  $0 < h < \delta^* = 1/(1 + a)$ . Здесь  $a = \max |\partial F / \partial x|$  по всем  $(X, t)$  из  $M$ . Ясно, что локальная универсальность  $\rho$  для всякого отображения  $DL$  легко устанавливается.

Аналогично определяется равномерная локальная универсальность  $\rho$  на  $M$  и для отображения  $D\pi$ .

Пусть теперь  $M$  — некоторое множество из пространства  $R^n$ . Тогда (глобальная) универсальность  $\rho$  на  $M$  для  $DP$  означает, что неравенство

$$\rho(DP) > 0$$

выполняется в каждой точке  $X$  из  $M$ .

2. Свойство  $\rho$  назовем *полугрупповым*, когда все отображения, обладающие свойством  $\rho$ , образуют полугруппу с операцией композиции. Например, при  $n = 1$  «тождественное» свойство

$$\rho(D\pi) \equiv \frac{\partial \pi(X, t, h)}{\partial x} > 0$$

является полугрупповым, поскольку композиция монотонно возрастающих функций оказывается монотонно возрастающей функцией. Напротив, свойство

$$\rho(D\pi) \equiv -\frac{\partial \pi}{\partial x} > 0$$

не является полугрупповым, так как композиция монотонно убывающих функций не является таковой.

По сути, полугрупповые свойства оказываются «мотором» данной схемы наследования.

Ниже при обсуждении отображений  $DL$  и  $D\pi$  под множеством  $M$  (из  $R^n \times R$ ) подразумевается кусок траектории (0.1) с началом в точке  $(X^0, 0)$  и концом в  $(X^T, T)$ , а при исследовании отображения  $P$  — проекция данного  $M$  на  $R^n$ . В этой связи «выражение на  $M$ » далее опускается. Справедлива почти тривиальная

**Теорема 1.** Пусть гладкое свойство  $\rho$  является полугрупповым и равномерно локально универсальным для  $D\pi$ . Тогда дифференциал глобального отображения Пуанкаре ( $DP$ ) наследует  $\rho$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Из равномерной локальной универсальности  $\rho$  для  $\pi$  следует существование такого  $\delta^*$ , что  $\rho(D\pi(X, t, h)) > 0$  для всех  $(X, t)$  из  $M$  и всех  $h$  из  $(0, \delta^*)$ .

Далее, выберем натуральное  $n$  из условия  $T/n < \delta^*$  и разобьем траекторию  $M$  на  $n$  равных временных участков. На каждом  $i$ -м участке соответствующее

локальное отображение  $D\pi_i$  обладает свойством  $\rho$ . Поскольку  $DP = D\pi_1 \times \dots \times D\pi_n$  и  $\rho$  — полугрупповое свойство, то и  $DP$  обладает свойством  $\rho$  на  $M$ .

Наконец, так как  $M$  — произвольная траектория, то  $DP$  обладает свойством  $\rho$  во всем фазовом пространстве (0.1), что и требовалось доказать.

В связи с теоремой 1 возникает проблема нахождения критериев равномерной локальной универсальности  $\rho$  для  $D\pi$ . С учетом компактности  $M$  весьма привлекательной представляется

**Гипотеза.** Пусть  $\rho$  локально универсально для  $DL$ , тогда  $\rho$  равномерно локально универсально для  $DL$  и  $D\pi$ .

Вероятно, без дополнительных ограничений на гладкую функцию  $\rho$  эта гипотеза неверна. Так, рассмотрим близкую задачу из математического анализа. Пусть  $u(x, h)$  — гладкая функция и для каждого  $x$  из  $[0, 1]$  существует свое локальное  $\delta(x) > 0$  такое, что  $u(x, h) > 0$  для всех  $h$  из интервала  $(0, \delta(x))$ . Верно ли, что здесь существует универсальное  $\delta^*$ ? В следующем примере (В. М. Капицкого) неравенство

$$u(x, h) = h(h - x)(h - 2x) > 0$$

выполняется при  $\delta(x) = x$  для  $x > 0$ , а при  $x = 0$  в качестве  $\delta$  можно взять, например, 1. Однако универсального  $\delta^*$  здесь не существует.

В этой связи приведем одну из простейших версий дополнительных ограничений, достаточных для справедливости этой гипотезы (для простоты возьмем  $n = 2$ ). Обозначим  $k_{ij} = \partial F_i(X, t) / \partial x_j$  и рассмотрим вспомогательную функцию

$$\varphi(h) = \rho(DL(X, t, h)) = \rho(1 + hk_{11}, hk_{12}, hk_{21}, 1 + hk_{22}) = a + hb(X, t, h).$$

Здесь согласно лемме Адамара  $a = \rho(1, 0, 0, 1)$  — константа и  $b(X, t, h)$  — гладкая функция; в частности,

$$b(X, t, 0) = k_{11}d_1 + k_{12}d_2 + k_{21}d_3 + k_{22}d_4,$$

где постоянный вектор  $\langle d_1, d_2, d_3, d_4 \rangle$  является градиентом функции  $\rho$  в точке  $(1, 0, 0, 1)$ .

Из локальной универсальности  $DL$  следует, что  $a \geq 0$ . А если  $a = 0$ , то  $b(X, t, h) > 0$  при всех  $(X, t)$  из  $M$  и  $0 < h < \delta(X, t)$ . Очевидно,  $a = \varphi(0)$  и  $b(X, t, 0) = \varphi'(0)$ . Ниже будем говорить, что  $\rho$  — *грубое свойство* (в нуле), если функция  $\rho$  гладкая и соответствующая вспомогательная функция  $\varphi$  удовлетворяет хотя бы одному из двух условий:

- 1)  $\varphi(0) > 0$ ;
- 2) если  $\varphi(0) = 0$ , то  $\varphi'(0) > 0$  для всех  $(X, t)$  из  $M$ .

Установим более слабый вариант вышеприведенной гипотезы.

**Теорема 2.** Если грубое свойство  $\rho$  локально универсально для  $DL$ , то оно равномерно локально универсально и для  $DL$ , и для  $D\pi$ .

**Доказательство.** Как и ранее, обозначим через  $M$  кусок произвольной траектории из расширенного фазового пространства с началом в точке  $(X^0, 0)$  и концом в точке  $(X^T, T)$ .

1. Сначала покажем «равномерность» для  $DL$ . Так, из локальной универсальности следует, что  $a + hb(X, t, h) > 0$  для всех  $0 < h < \delta(X, t)$ . В силу грубости  $\rho$  здесь должен выполняться один из следующих двух вариантов.

(а)  $a > 0$ . Обозначим  $B = \min\{b(X, t, h) : (X, t, h) \in M \times [0, 1]\}$ . Тогда при  $h > 0$  имеет место неравенство

$$a + hb(X, t, h) \geq a + hB.$$

При  $B \geq 0$  положим  $\Delta = 1$ . Если  $B < 0$ , то положим  $\Delta = \min(1, -a/B)$ . Ясно, что при всех  $h$  из  $(0, \Delta)$  правая часть данного неравенства положительна. Значит, будет положительной и левая часть.

(б)  $a = 0$  и  $b(X, t, 0) > 0$  для всех  $(X, t)$  из  $M$ . Воспользуемся адамаровским представлением

$$b(X, t, h) = b(X, t, 0) + hc(X, t, h),$$

где  $c(X, t, h)$  — гладкая функция. Пусть  $\beta$  — минимальное значение функции  $b(X, t, 0)$  при  $(X, t)$  из  $M$ . Тогда  $\beta > 0$ . Пусть  $\gamma$  — минимальное значение  $c(X, t, h)$  по всем  $(X, t)$  из  $M$  и  $0 \leq h \leq 1$ . Для таких  $h$  выполняется неравенство

$$b(X, t, h) \geq \beta + h\gamma.$$

Очевидно, при  $\gamma \geq 0$  имеет место  $b(X, t, h) > 0$  равномерно для всех  $h \leq 1$ . А при  $\gamma < 0$  справедливо  $b(X, t, h) > 0$  равномерно для всех  $h \leq \beta/|\gamma|$ .

2. Теперь с учетом оценок из предыдущего пункта покажем «равномерность» для  $D\pi$ . А именно, построим адамаровское представление (до членов порядка  $h^3$ )

$$\lambda(h) = \rho(D\pi(X, t, h)) = a + hb(X, t, 0) + h^2c(X, t, h).$$

Поскольку  $D\pi$  совпадает с  $DL$  с точностью до  $h^2$ , в этом представлении  $a$  и  $b$  имеют прежний смысл, а  $c$  — гладкая по всем переменным функция.

Обозначим через  $B$  и  $C$  минимальные значения гладких функций  $b(X, t, 0)$  и  $c(X, t, h)$  по всем  $(X, t)$  из компакта  $M$  и  $0 \leq h \leq 1$ . Построим специальную квадратичную форму

$$\mu(h) = a + hB + h^2C.$$

Очевидно,  $\lambda(h) > \mu(h)$  для всех  $h > 0$ . Оценим снизу  $\mu$  при малых  $h$ . Здесь возникают следующие варианты.

(а)  $a > 0$ . Тогда найдется малое  $\Delta > 0$  такое, что при всех  $h$  из  $(0, \Delta)$  имеет место  $\mu(h) > 0$ . Значит, тем более  $\lambda(h) > 0$  для таких  $h$ .

(б)  $a = 0$ . Поскольку  $b(X, t, 0) > 0$  для всех  $(X, t)$  из  $M$ , то  $B > 0$ . Следовательно, найдется  $\Delta > 0$  такое, что при всех  $h$  из  $(0, \Delta)$  имеет место

$$\mu(h) = h(B + hC) > 0.$$

Поэтому тем более  $\lambda(h) > 0$  для таких  $h$ , что и требовалось доказать.

Ясно, что понятие грубого свойства можно последовательно «смягчать», используя все более и более длинные адамаровские представления  $\varphi(h)$ . Например, можно было бы «более тонко» определить грубое свойство  $\rho$  так: в каждой точке  $(X, t)$  из  $M$  функция  $\varphi(h) = \rho(DL(X, t, h))$  удовлетворяет хотя бы одному из трех условий:

- 1)  $\varphi(0) > 0$ ;
- 2)  $\varphi'(0) > 0$ ;
- 3) если  $\varphi(0) = 0$  и  $\varphi'(0) = 0$ , то  $\varphi''(0) > 0$ .

Приведем простые примеры грубых свойств.

ПРИМЕР 1. Свойство определителя дифференциала локальных отображений  $DL$  и  $D\pi$  быть положительным числом является грубым. Действительно, в этом случае (для наглядности  $n = 2$ ) имеем

$$\varphi(h) = \rho(1 + hk_{11}, hk_{12}, hk_{21}, 1 + hk_{22}) = (1 + hk_{11})(1 + hk_{22}) - h^2 k_{12} k_{21}$$

и, значит,  $\varphi(0) = 1$ . Далее, положительные числа образуют полугруппу по умножению. Поэтому  $|DP| > 0$ , т. е.  $P(X)$  — локальный диффеоморфизм, сохраняющий ориентацию.

ПРИМЕР 2. Проведем качественный анализ общей модели динамики численности популяции  $(x)$  в  $T$ -периодической среде [2]:

$$\dot{x} = xf(x, t), \quad (1.3)$$

где  $f(x, t)$  — гладкая функция и  $\partial f / \partial x < 0$ ;  $f(x, t) = f(x, t + T)$ ; для некоторой универсальной константы  $N$  выполняется неравенство  $f(x, t) < 0$  для всех  $x > N$  и  $t$ .

Отметим, что  $dx/dt \leq xf(0, t)$ . Следовательно, решение (1.3) растет не быстрее экспоненты и, значит, продолжается вперед неограниченно. Имеют место следующие свойства.

СВОЙСТВО МОНОТОННОСТИ. Для каждой пары  $(x, t)$  выполняется

$$\rho\left(\frac{\partial L}{\partial x}\right) \equiv \frac{\partial L}{\partial x} = 1 + h \frac{\partial [xf(x, t)]}{\partial x} > 0$$

при малых  $h$ . Очевидно, такое  $\rho$  — грубое свойство. Далее, поскольку положительные числа образуют полугруппу по умножению, то  $\partial P / \partial x > 0$ . Тем самым  $P$  монотонно возрастает.

СВОЙСТВО СЖИМАЕМОСТИ. Сделаем замену  $y = \ln(x)$ , тогда уравнение (1.3) приобретает вид

$$\frac{dy}{dt} = f(\exp(y), t).$$

В этом случае

$$\rho\left(\frac{\partial L}{\partial y}\right) \equiv \frac{\partial L}{\partial y} = 1 + hf'_x(\exp(y), t) \exp(y).$$

Из  $f'_x < 0$  следует, что  $0 < \partial L / \partial y < 1$  при малых  $h > 0$ . Поскольку числа из интервала  $(0, 1)$  образуют полугруппу по умножению и  $\rho$  — грубое свойство, то

$$0 < \frac{\partial P}{\partial y} < 1.$$

Поэтому если в данном уравнении существует равновесие  $(r)$ , то оно единственно и глобально устойчиво.

УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ. Обозначим через  $\lambda$  интеграл от функции  $f(0, t)$  на  $[0, T]$  и через  $x^T = R(x^0)$  — отображение Пуанкаре для уравнения (1.3). Имеет место простое

**Утверждение 1.** Пусть  $\lambda > 0$ , тогда отображение  $R$  имеет единственную положительную неподвижную точку  $(r^*)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу предыдущих свойств достаточно установить существование положительной неподвижной точки. При начальном  $x^0$  обозначим

через  $M = M(x^0)$  максимальное значение переменной  $x^t$  на временном промежутке  $[0, T]$ . Очевидно,  $M(x) \rightarrow 0$  при  $x \rightarrow 0$ . Обозначим через  $\mu$  интеграл от функции  $f(M, t)$  при изменении  $t$  в интервале  $[0, T]$ . Разумеется,  $\mu \leq \lambda$ . Отметим, что  $\mu \rightarrow \lambda$  при  $M \rightarrow 0$ .

Далее, на  $[0, T]$  выполняется неравенство

$$\frac{dx}{dt} \geq xf(M, t),$$

и, значит,  $x^T = R(x^0) \geq x^0 \exp(\mu)$ . Следовательно,  $R'(0) > 1$ , и при малых  $x$  график  $R$  лежит выше биссектрисы первого квадранта.

Пусть теперь  $x^0 > N$ , где  $N$  — универсальная константа (см. ограничения к (1.3)). Тогда решение (1.3) убывает вплоть до значения  $N$  и после этого уже не превосходит  $N$ . Поэтому  $R(x^0) < x^0$  и, значит, здесь график  $R$  лежит ниже биссектрисы. Окончательно получаем, что в промежутке  $(0, N)$  график  $R$  пересекает биссектрису в некоторой (неподвижной для  $R$ ) точке, что и требовалось доказать.

В заключение этого раздела отметим, что из монотонного роста  $R$  следует: при  $x^0 < r^*$  происходит движение вперед (т. е.  $x^0 < x^T$ ), а при  $x^0 > r^*$  происходит движение назад (т. е.  $x^0 > x^T$ ).

## 2. Наследуемость знак-инвариантных матриц

Различные приемы позволяют расширить класс наследуемых свойств. Так, из обоснования теорем 1 и 2 сразу получаем следующее утверждение.

**Лемма 1.** Пусть каждое из грубых свойств  $\rho_i$  локально универсально для  $DL$ . Если  $\rho = \min(\rho_1, \dots, \rho_n)$  — полугрупповое свойство, то и дифференциал отображения Пуанкаре ( $DP$ ) наследует  $\rho$ .

Такого сорта кусочно-гладкие свойства возникают при описании характера монотонности компонент многомерных отображений Пуанкаре. Например, для  $Q: R^2 \rightarrow R^2$  возникают 16 типичных вариантов знаковой структуры

$$DQ = \begin{pmatrix} \partial Q_1 / \partial x_1 & \partial Q_1 / \partial x_2 \\ \partial Q_2 / \partial x_1 & \partial Q_2 / \partial x_2 \end{pmatrix}.$$

Всякая знаковая структура  $DQ$  может быть задана с помощью операции  $\min$ . Так, система неравенств

$$\frac{\partial Q_1}{\partial x_1} > 0, \quad \frac{\partial Q_1}{\partial x_2} < 0, \quad \frac{\partial Q_2}{\partial x_1} < 0, \quad \frac{\partial Q_2}{\partial x_2} > 0$$

эквивалентна одному неравенству

$$\min \left\{ \frac{\partial Q_1}{\partial x_1}, -\frac{\partial Q_1}{\partial x_2}, -\frac{\partial Q_2}{\partial x_1}, \frac{\partial Q_2}{\partial x_2} \right\} > 0.$$

В частности, для  $Q = L(X, t, h)$  при  $n = 2$  имеем

$$DL = \begin{pmatrix} 1 + h\partial F_1 / \partial x_1 & h\partial F_1 / \partial x_2 \\ h\partial F_2 / \partial x_1 & 1 + h\partial F_2 / \partial x_2 \end{pmatrix}.$$

Здесь при малых  $h > 0$  диагональные элементы всегда положительны. Пусть, кроме того,  $\partial F_1 / \partial x_2$  и  $\partial F_2 / \partial x_1$  сохраняют свои знаки при всех  $(X, t)$ . Тогда

абсолютная величина каждого элемента  $DL$  является локально универсальным и грубым свойством.

Поставим теперь специальный вопрос о «наследовании». Пусть все  $DL$  представляются одной и той же знаковой матрицей  $\Sigma$  для всех  $(X, t)$ . Когда  $DP$  описывается той же матрицей  $\Sigma$ ?

Для удобства вместо знаков  $+$  и  $-$  будем писать  $+1$  и  $-1$  соответственно. Оказывается, все такие (*знак-инвариантные*) матрицы допускают полное описание [3]. Формально они задаются таблицей  $\Sigma(c_1, \dots, c_n) = (\sigma_{ij})$ , элементы которой равны  $\sigma_{ij} = c_i c_j$ . Здесь каждый параметр  $c_i$  может принимать одно из двух значений  $\pm 1$ . Например, при  $n = 2$  существуют только две разные знак-инвариантные матрицы

$$\Sigma(1, 1) = \Sigma(-1, -1) = \begin{pmatrix} +1 & +1 \\ +1 & +1 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \Sigma(-1, 1) = \Sigma(1, -1) = \begin{pmatrix} +1 & -1 \\ -1 & +1 \end{pmatrix}.$$

Матрицы с фиксированной знак-инвариантной структурой  $\Sigma(c_1, \dots, c_n)$ , очевидно, образуют полугруппу по умножению. Отсюда вытекает

**Теорема 3.** *Если все  $DL$  принадлежат одной и той же знак-инвариантной структуре ( $\Sigma$ ), то и  $DP$  принадлежит  $\Sigma$ .*

Представляет интерес задача описания всех полугрупп матриц с операцией умножения. Укажем частный (геометрический) способ построения таких полугрупп. Пусть  $V$  — некоторое подмножество в  $\mathbb{R}^n$ . Тогда семейство ( $M$ ) всех матриц (размера  $n \times n$ ), переводящих  $V$  в себя, является, очевидно, полугруппой по умножению. Если  $V$  отлично от нулевого вектора и от всего  $\mathbb{R}^n$ , то будем говорить, что  $M$  допускает (*нетривиальное*) геометрическое представление  $V$ . В частности,

- а) полугруппа  $\Sigma(1, -1)$  представляется четвертым квадрантом плоскости;
- б) полугруппа вращений представляется сферой с центром в начале координат.

Всякая ли мультипликативная полугруппа матриц допускает геометрическое представление?

**Утверждение 2.** *Полугруппа вырожденных матриц не допускает геометрического представления.*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $x$  — ненулевой вектор из  $V$ . Тогда для любого  $y$  из  $\mathbb{R}^n$  выполняется соотношение  $y = Mx$  для некоторой вырожденной матрицы  $M$ . Значит,  $V$  совпадает с  $\mathbb{R}^n$ , что и требовалось доказать.

Ниже на основании различных наследуемых грубых свойств проводится исследование неавтономных моделей конкуренции.

### 3. Динамика двух конкурентов и матрицы $\Sigma(1, -1)$

Рассмотрим систему двух конкурентов в общем виде:

$$\dot{x}_1 = x_1 f_1(x_1, x_2, t), \quad \dot{x}_2 = x_2 f_2(x_1, x_2, t), \quad (3.1)$$

где  $f_i$  является  $T$ -периодической (по времени  $t$ ) функцией роста  $i$ -й популяции. Напомним [4] традиционные здесь допущения:

- 1) каждая  $f_i$  — гладкая функция, строго убывающая по  $x_i$  и  $x_j$ ;
- 2) существует универсальная константа  $N > 0$  такая, что при  $\max\{x_1, x_2\} > N$  выполняется  $f_i(x_1, x_2, t) < 0$  для всех  $t$  и  $i = 1, 2$ ;

3) существует другая универсальная константа  $m > 0$  такая, что  $f_i(x_1, x_2, t) > -m$  для всех  $x_1, x_2, t$  и  $i = 1, 2$ .

Далее, дифференциал локального отображения (3.1) представляется знак-инвариантной структурой  $\Sigma(1, -1)$ . Тем самым в силу признака наследования знаковая структура дифференциала глобального отображения Пуанкаре  $P = (P_1, P_2)$  также имеет вид  $\Sigma(1, -1)$ . Иными словами, каждая функция  $P_i$  монотонно возрастает по «своей» переменной ( $x_i$ ) и убывает по «чужой» переменной.

На точках плоскости  $R_+^2$  зададим следующее отношение полупорядка. Пусть даны две точки  $A = (a_1, a_2)$  и  $B = (b_1, b_2)$ . Положим  $A \ll B$ , если выполняются неравенства  $a_1 \leq b_1$  и  $a_2 \geq b_2$ . Из свойств монотонности  $P$  устанавливаем, что данное отношение полупорядка и отображение  $P$  «согласованы». А именно, справедлива

**Лемма 2.** Если  $A \ll B$ , то и  $P(A) \ll P(B)$ .

В общем случае пусть  $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  и  $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ . Если дифференциал  $DP$  описывается знак-инвариантной структурой  $\Sigma(c_1, \dots, c_n)$ , то следующее отношение полупорядка ( $A \ll B$ ):

$$a_i c_i \leq b_i c_i \quad \text{для всех } i = 1, \dots, n,$$

сохраняется при действии  $P$ .

Пусть на плоскости заданы две точки  $A$  и  $B$ , связанные отношением  $A \ll B$ . Тогда рассмотрим конусный отрезок  $\Pi(A, B)$  — множество промежуточных точек  $X$ , удовлетворяющих одновременно условиям  $A \ll X$  и  $X \ll B$ . Геометрически  $\Pi(A, B)$  — прямоугольник, в котором самая «слабая» точка ( $A$ ) находится на северо-западе, а самая «сильная» точка ( $B$ ) лежит на юго-востоке. Из леммы 2 вытекает

**Теорема 4.** Под действием  $P$  образ конусного отрезка  $\Pi(A, B)$  вложен в конусный отрезок  $\Pi(P(A), P(B))$ .

Будем говорить, что отображение  $P$  стягивает компакт  $D$ , если образ  $P(D)$  вложен в  $D$ . Когда  $D$  — конусный отрезок  $\Pi(A, B)$ , для проверки «стягивания» достаточно установить, что «экстремальные» точки  $A$  и  $B$  отображаются вовнутрь  $D$  (см. теорему 4).

Дальнейшее развитие теории конкуренции двух популяций может быть основано на анализе геометрического расположения изоклин  $E_1$  и  $E_2$  в  $R^{+2}$ , где

$$E_i = \{(x_1^0, x_n^0) \mid x_i^0 = x_i^T > 0\}.$$

Очевидно, уравнение  $x_i = P_i(x_1, x_2)$  — аналитический способ задания множества  $E_i$ . Исследуем свойства изоклин на примере  $E_1$ . Обозначим через  $\lambda_1$  интеграл от функции  $f_1(0, 0, t)$  на  $[0, T]$ . Имеет место

**Лемма 3.** Пусть  $\lambda_1 > 0$ , тогда изоклина  $E_1$  непуста и представляет собой график некоторой непрерывной функции  $x_2 = E_1(x_1)$ .

**Доказательство.** Пусть сначала (ордината)  $x_2 = 0$ , тогда на оси абсцисс переменная  $x_1$  описывается уравнением вида (1.3). Согласно утверждению 1 здесь существует неподвижная точка  $(r_1)$ . Таким образом, точка  $(r_1, 0)$  принадлежит  $E_1$  и, значит,  $E_1$  непусто.

Возьмем произвольное  $x_1^0$  из  $(0, r_1]$ , и пусть  $L$  — вертикальная прямая ( $L$ ) из  $R_+^2$ , проходящая через точку  $(x_1^0, 0)$ . Исследуем поведение функции  $P_1$  (первой компоненты отображения  $P$ ) на  $L$ . В силу монотонности  $P_1$  убывает при возрастании  $x_2$ .

Далее, под действием  $P$  «самая нижняя» начальная точка  $\langle x_1^0, 0 \rangle$  движется вперед по оси абсцисс (т. е.  $x_1^0 < x_1^T$ ).

Теперь возьмем «достаточно высокую» начальную точку на данной прямой  $\langle x_1^0, x_2 \rangle$ , где  $x_2 > N \exp(mT)$ . Из допущения 3 следует, что  $x_2^t > N$  для всех  $t \leq T$ . Значит, в силу допущения 2 на данном временном интервале переменная  $x_1$  убывает. Поэтому здесь имеем  $x_1^0 > x_1^T$ .

Следовательно, существует промежуточное (и единственное)  $x_2^0$ , для которого  $x_1^0 = P_1(x_1^0, x_2^0)$ . Иными словами, для каждого  $x_1 < r_1$  найдется единственная точка  $(x_1, x_2)$ , принадлежащая  $E_1$ .

Наконец, рассмотрим уравнение  $H(x_1, x_2) = x_1 - P_1(x_1, x_2) = 0$ . Очевидно,  $\partial H / \partial x_2 > 0$ , поэтому переменная  $x_2$  локально и однозначно выразима через  $x_1$  гладким образом. После «склеивания» всех таких локальных представлений получаем искомую функцию  $E_1$ , что и требовалось доказать.

Аналогично изоклина  $E_2$  задается некоторой кривой  $x_1 = E_2(x_2)$ . Каждая из этих функций определена на своем полуинтервале  $(0, r_i]$ . Будем говорить, что точка  $X^0 = (x_1^0, x_2^0)$  находится ниже изоклины  $J_i$ , если  $P_i(x_1^0, x_2^0) - x_i^0 > 0$ . Из монотонности  $P$  следует, что кривая  $E_i$  «притягивает» фазовые точки (см. рис. 1):

- 1) если  $\langle x_1^0, x_2^0 \rangle$  находится ниже кривой  $E_i$ , то  $x_i^0 < x_i^T$ ;
- 2) если  $\langle x_1^0, x_2^0 \rangle$  находится выше кривой  $E_i$ , то  $x_i^0 > x_i^T$ .




РИС. 1. Стягивающиеся под действием  $P$  конусные отрезки в зависимости от расположения изоклин системы (3.1).

Здесь изоклины  $E_1$  — пунктирная и  $E_2$  — сплошная линии.

Пусть  $\lambda_i > 0$  для всех  $i$ . Возможны следующие три варианта расположения изоклин.

(а) Изоклины не пересекаются, и, например,  $E_1$  расположена выше  $E_2$ . Пусть  $E_1$  пересекает ось  $x_1$  в точке  $r_1$ . Тогда с помощью кривой  $E_1$  может быть построена семейство стягивающихся к точке  $(r_1, 0)$  конусных отрезков (рис. 1,а). Это означает, что в системе (3.1) первая популяция вытесняет вторую.

(б) Изоклины пересекаются в одной внутренней точке  $R_+^2$ . Тогда возможно как устойчивое сосуществование популяций (см. рис. 1,б), так, неустойчивое сосуществование популяций (если на рис. 1,б поменять местами  $E_1$  и  $E_2$ ).

(в) Изоклины пересекаются в нескольких внутренних точках. Тогда устойчивые и неустойчивые равновесия «чередуются». При этом устойчивость равновесий устанавливается путем построения подходящего семейства стягивающихся конусных отрезков.

#### 4. Динамика многих конкурентов и матрицы $\Sigma(1, \dots, 1)$

Рассмотрим систему из  $n$  взаимодействующих конкурентов:

$$\dot{x}_i = x_i f_i(x_1, \dots, x_n, t), \quad (4.1)$$

где  $i = 1, \dots, n$ ; каждая гладкая функция  $f_i$  убывает по всем компонентам вектора  $X = \{x_1, \dots, x_n\}$  из  $R_+^n$ ;  $f_i$  является  $T$ -периодической функцией по аргументу  $t$ ; существуют универсальные константы  $N > 0$  и  $m > 0$  такие, что

- а)  $f_i(X, t) < 0$  при  $\max\{x_1, \dots, x_n\} > N$  и всех  $t$ ;
- б)  $f_i(X, t) > -m$  при всех  $X$  и  $t$ .

В таких моделях переменные изменяются не быстрее соответствующих экспонент, поэтому решения (4.1) продолжают вперед и назад неограниченно. В силу специфики правых частей модели (4.1) положительность переменных сохраняется все время. При этом вся траектория не выходит за пределы некоторого компакта из  $R_+^n$ .

Для системы (4.1) актуальны прежние задачи:

1) задать отношение полупорядка в  $R_+^n$ , которое сохраняется при действии отображения Пуанкаре ( $P = \langle P_1, \dots, P_n \rangle$ );

2) какова геометрическая структура и взаимное расположение «изоклин»  $E_i = \{(x_1^0, \dots, x_n^0) \mid x_i^0 = x_i^T > 0\}$  в зависимости от свойств правых частей  $\{f_i\}$ ?

Оказывается, при  $n \geq 3$  применение геометрического подхода из разд. 3 сталкивается с принципиальными трудностями: знаковая структура  $DL$  не является знак-инвариантной (диагональ положительна, а остальные элементы отрицательны). Поэтому отображение  $P$  может оказаться «плохим», поскольку может не обладать монотонными свойствами.

Кроме того, ввиду отсутствия сведений о знаках  $DP$  трудно установить является ли множество  $E_i$  поверхностью и т. д.

Тем не менее здесь возможен окольный путь. В (4.1) заменим направление времени противоположным ( $t \rightarrow -t$ ). Эта система действует в том же фазовом пространстве, но чтобы не возникало путаницы в новой системе, переименуем переменные

$$\dot{y}_i = -y_i f_i(y_1, \dots, y_n, -t), \quad (4.2)$$

где  $i = 1, \dots, n$ . Сдвиг-отображение за период ( $Q$ ) системы (4.2) оказывается «хорошим», поскольку знаковая структура дифференциала локального отображения (4.2) является знак-инвариантной матрицей  $\Sigma(1, \dots, 1)$ . Значит, в координатном представлении  $y_i^T = Q_i(y_1^0, \dots, y_n^0)$  функция  $Q_i$  возрастает по каждой переменной.

Следуя разд. 3, определим отношение полупорядка на точках замыкания  $R_+^n$ , согласованное с отображением  $Q$ . Пусть  $A = (a_1, \dots, a_n)$  и  $B = (b_1, \dots, b_n)$ . Положим  $A \ll B$ , если  $a_i \leq b_i$  для всех  $i$ . Ввиду монотонности отображения  $Q$  получаем аналог леммы 2: из  $A \ll B$  следует  $P(A) \ll P(B)$ .

Очевидно,  $Q = (Q_1, \dots, Q_n)$  — обратное отображение к  $P$ . Поэтому векторное поле в (4.1) получается путем обращения стрелок в векторном поле (4.2). В частности, неподвижные точки отображений  $P$  и  $Q$  совпадают. Используя принцип наследования, опишем монотонные свойства компонент  $Q$ . Для всех  $i$  имеет место

**Лемма 4.** Частные производные функции  $Q_i(y_1, \dots, y_n)$  удовлетворяют неравенствам:

- 1)  $\partial Q_i / \partial y_j > 0$  для всех  $j$  и  $i$ ;
- 2) если  $y_i = Q_i(y_1, \dots, y_n)$ , то  $\partial Q_i / \partial y_i > 1$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Произведем в (4.2) монотонную замену  $y_j = \exp(z_j)$  для всех  $j$ . Тогда

$$\frac{dz_i}{dt} = -f_i(\exp(z_1), \dots, \exp(z_n), -t), \quad (4.3)$$

где  $i = 1, \dots, n$ . Через  $R = (R_1, \dots, R_n)$  обозначим сдвиг-отображение за период  $T$ , индуцированное (4.3). Рассмотрим дифференциал локального отображения данной системы. Его знаковая структура состоит из одних плюсов, а на диагонали «сидят» элементы большие единицы (сказанное выразимо с помощью грубых свойств). Далее, такие матрицы образуют полугруппу по умножению, и значит, дифференциал глобального отображения  $R$  обладает тем же свойством. Следовательно,

$$\frac{\partial R_i}{\partial z_j} > 0 \quad \text{для всех } j, i \quad \text{и} \quad \frac{\partial R_i}{\partial z_i} > 1. \quad (4.4)$$

Из первого неравенства (4.4) сразу следует, что  $\partial Q_i / \partial y_j > 0$  для всех  $j, i$ .

Обоснование второго соотношения данной леммы проведем на примере  $i=1$ . Очевидно,

$$Q_1(y_1, \dots, y_n) = \exp[R_1(\ln y_1, \dots, \ln y_n)].$$

Поэтому с учетом условия  $y_1 = \exp[R_1(\ln y_1, \dots, \ln y_n)]$  и второго неравенства (4.4) получаем

$$\frac{\partial Q_1}{\partial y_1} > 1,$$

что и требовалось доказать.

На основе системы (4.2) определим для каждого  $i$  изоклину

$$J_i = \{(y_1^0, \dots, y_n^0) \mid y_i^0 = y_i^T > 0\}.$$

Имеет место принцип двойственности:  $E_i = Q(J_i)$  и  $P(E_i) = J_i$ .

Обозначим через  $\lambda_i$  — интеграл от функции  $f_i(0, \dots, 0, t)$  на  $[0, T]$ . Аналогично обоснованию леммы 3 устанавливаем, что если  $\lambda_i > 0$ , то множество  $J_i$  не пусто. Поэтому в дальнейшем считаем, что  $\lambda_i > 0$  при всех  $i$ .

Удобно задать  $J_i$  соотношением  $y_i = Q_i(y_1, \dots, y_n)$  и ввести вспомогательную функцию  $H(y_i) = Q_i(y_1, \dots, y_n) - y_i$  при фиксированных остальных переменных. Из леммы 4 получаем  $\partial H(y_i) / \partial y_i > 0$ , поэтому  $H$  — возрастающая функция на  $J_i$ . Более того, из теоремы о неявной функции следует возможность выразить  $y_i$  через остальные переменные. Например, поверхность  $J_1$  может быть задана соотношением  $y_1 = \varphi_1(y_2, \dots, y_n)$ . При этом  $\partial \varphi_1 / \partial y_j < 0$  для всех  $j > 1$ . Поэтому в обратном времени изоклины всегда задаются монотонными функциями (ср. с немонотонными изоклинами разд. 3).

Будем говорить, что точка  $Y = (y_1, \dots, y_n)$  находится *ниже изоклины*  $J_i$ , если  $Q_i(Y) - y_i < 0$ . В случае реализации противоположного строгого неравенства считаем точку  $Y$  лежащей выше  $J_i$ . Отметим, что неравенство  $y_1 < \varphi_1(y_2, \dots, y_n)$  также эквивалентно условию, что точка  $Y$  лежит ниже  $J_1$ . Самое главное здесь возникают своеобразные процессы «отталкивания» векторного поля  $Q$  от каждой изоклины  $J_i$ :

- 1) если точка  $Y^0$  лежит ниже  $J_i$ , то  $y_i^T < y_i^0$ ;
- 2) если точка  $Y^0$  лежит выше  $J_i$ , то  $y_i^T > y_i^0$ .




Рис. 2. Двумерная иллюстрация взаимосвязи фазовых портретов систем (4.1) и (4.2).

Определим конусный отрезок  $\Pi(A, B)$  как множество промежуточных точек, заключенных между точками  $A$  и  $B$ . Геометрически  $\Pi(A, B)$  представляет собой  $n$ -мерный прямоугольник, в котором  $A$  — самая юго-западная и  $B$  — самая северо-восточная вершины.

Будем говорить, что отображение  $Q$  *растягивает конусный отрезок*  $\Pi(A, B)$ , если образ  $Q(\Pi(A, B))$  накрывает  $\Pi(A, B)$ . Иными словами, для установления «растягивания» необходимо и достаточно, чтобы на всей границе  $\Pi(A, B)$  векторное поле  $Q$  было направлено наружу.

Пусть  $R$  — неподвижная точка отображения  $Q$  (а значит, и  $P$ ), окруженная семейством конусных отрезков  $\Pi_k = \Pi(A_k, B_k)$ . При этом  $A_k \rightarrow R$  и  $B_k \rightarrow R$ , когда  $k \rightarrow \infty$ . Обозначим через  $\Delta_k$  образ  $\Pi_k$  под действием  $Q$ . Почти тривиальна (см. рис. 2)

**Лемма 5.** Если  $Q$  растягивает  $\Pi_k$ , то  $P$  стягивает  $\Delta_k$ .

По сути, вся подготовительная работа произведена с помощью «хорошего» отображения  $Q$ . Теперь заключительный шаг рассуждения легко осуществить в рамках исходного «плохого» отображения  $P$ .

**Теорема 5.** Пусть вокруг  $R$  можно построить семейство вложенных  $\{\Pi_k\}$ . Если  $Q$  растягивает каждое  $\Pi_k$ , то  $R$  — устойчивое равновесие в системе (4.1).

Разумеется, вместо конусных отрезков можно брать и другие геометрические объекты. Так, в работе [5] приведено построение конкретного семейства вложенных призм для обоснования критерия отбора в определенном классе моделей конкуренции.

Отметим, что прямолинейная попытка (т. е. без обращения к вспомогательной системе (4.2)) построить в фазовом пространстве (4.1) семейство стягивающихся к равновесию  $R$  криволинейных областей  $\{\Delta_k\}$  представляет собой трудноразрешимую задачу.

### Заключение

Приведем некоторые задачи и примеры расширения класса наследуемых свойств с сохранением прежнего механизма наследования.

1. Учет высших частных производных. Например, если в одномерной модели (1.3) правая часть — вогнутая функция  $x$  (при каждом фиксированном  $t$ ), то и отображение Пуанкаре вогнуто.

2. Задание свойств  $DL$  в форме нестрого неравенства  $\rho(DL) \geq 0$ . Свойство быть треугольной матрицей выразимо в следующей форме. Очевидно, если все  $DL$  задаются треугольной матрицей, то и  $DP$  будет матрицей того же вида.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1984.
2. Vance R. R., Coddington E. A. A nonautonomous model of population growth // J. Math. Biology. 1989. V. 27, N 5. P. 491–506.
3. Ильичев В. Г., Ильичева О. А. Знак-инвариантные структуры матриц и дискретные модели // Дискретная математика. 1999. Т. 11, № 4. С. 89–100.
4. Гимельфарб А. А., Гинзбург Л. Р., Полуэктов Р. А. и др. Динамическая теория биологических популяций. М.: Наука, 1974.
5. Ильичев В. Г. Универсальные константы запаса и критерии отбора в переменной среде // Мат. заметки. 2001. Т. 70, № 5. С. 691–704.

*Статья поступила 24 апреля 2001 г.*

*Ильичев Виталий Григорьевич  
Ростовский гос. университет, механико-математический факультет,  
Зорге, 5, Ростов-на-Дону 344090  
vita@math.rsu.ru*