

ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА КОШИ  
С ДАННЫМИ НА ДВУХ  
ПОВЕРХНОСТЯХ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОЙ  
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

А. Л. Казаков

**Аннотация:** Рассматривается обобщенная задача Коши с данными на двух поверхностях для квазилинейной аналитической системы второго порядка. Отличие обобщенной задачи Коши от задачи Коши в традиционной постановке состоит в том, что начальные условия для разных неизвестных функций заданы на разных поверхностях: для каждой неизвестной функции ставится свое начальное условие на своей координатной оси. Ранее обобщенная задача Коши рассматривалась в работах Ш. Рикье, Н. М. Гюнтера, С. Л. Соболева, Н. А. Леднева, В. М. Тешукова, С. П. Баутина. В данной работе строится решение обобщенной задачи Коши в случае, когда в системе уравнений с частными производными дополнительно присутствуют значения производных неизвестных функций (в том числе выводных), заданные на координатных осях. Последнее обстоятельство принципиально отличает задачу, рассмотренную в настоящей статье, от ранее изученных обобщенных задач Коши.

**Ключевые слова:** квазилинейная система уравнений с частными производными, начально-краевая задача, теорема существования и единственности аналитического решения.

Одной из актуальных проблем теории дифференциальных уравнений с частными производными является доказательство аналогов и обобщений теоремы Ковалевской.

Обобщение задачи Коши (ЗК) на случай, когда начальные данные для разных функций заданы на разных поверхностях, впервые рассмотрено в работе французского математика Рикье [1]. Монография Рикье является библиографической редкостью, изложение некоторых положений теории Рикье можно найти в книге С. П. Финикова [2]. Результаты Рикье получили развитие в трудах российских математиков Н. М. Гюнтера [3, 4], С. Л. Соболева [5, 6] и Н. А. Леднева [7]. Именно Н. А. Леднев предложил термин «обобщенная задача Коши» (ОЗК).

В работах С. П. Баутина [8, 9] исследована ОЗК для квазилинейной аналитической системы 2-го порядка, в том числе сформулированы необходимые и достаточные условия существования решения в виде формальных двойных рядов и достаточные условия сходимости рядов. Используя методику, предложенную в [9], удалось доказать [10] теорему существования и единственности

---

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды проектов 02-01-011-22, 04-01-00-205).

локально аналитического решения ОЗК для квазилинейной системы 2-го порядка с особенностью вида  $u/x$  или  $x/u$ .

Содержательным приложением теории уравнений с частными производными является решение задач механики сплошной среды, в частности, газовой динамики. В работах В. М. Тешукова [11–14] в процессе построения кусочно аналитических течений газа с ударными волнами решаются конкретные ОЗК с использованием специальной методики. При этом для рассмотренных задач проверены необходимые и достаточные условия существования формального решения. При ограничениях, вызванных физическим смыслом задач, доказана сходимость рядов. В [15, 16] с использованием ОЗК исследуются течения газа с ударными волнами в окрестности оси или центра симметрии, где система уравнений газовой динамики имеет особенность вида  $u/r$  ( $u$  — скорость газа,  $r$  — расстояние до оси или центра симметрии).

В настоящей работе строится решение ОЗК с данными на двух поверхностях для квазилинейной аналитической системы 2-го порядка. Методика исследования основывается на методике, предложенной С. П. Баутиным [9], дополняет ее и обобщает на случай, когда в системе уравнений с частными производными дополнительно присутствуют значения производных неизвестных функций (в том числе выводящих), заданные на координатных осях. Последнее обстоятельство принципиально отличает задачу, рассмотренную в данной статье, от ранее изученных в [1–9], но схожие начально-краевые задачи для нелинейных уравнений с частными производными, содержащих также значения производных неизвестных функций, заданные на координатных осях, рассматривались в работе С. П. Баутина [17].

В настоящей работе получены необходимые и достаточные условия существования решения рассмотренной ОЗК в виде двойных рядов по степеням независимых переменных. Выписаны системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), при решении которых определяются коэффициенты рядов. Системы решены методом Гаусса и получены явные формулы для искомых коэффициентов. В результате анализа данных формул определены достаточные условия сходимости построенных рядов. Получены также удобные для проверки достаточные условия, при выполнении которых рассмотренная ОЗК имеет единственное локально аналитическое решение. Приведены контрпримеры и теоремы, которые показывают, что сформулировать необходимые и достаточные условия аналитической разрешимости ОЗК в данном случае невозможно, а также что при невыполнении любого из полученных достаточных условий сходимости ряды могут как сходиться, так и расходиться.

Рассматривается квазилинейная система уравнений с частными производными в случае двух неизвестных функций, зависящих от двух независимых переменных:

$$A(\vec{x}, \vec{U})\vec{U}_x + B(\vec{x}, \vec{U})\vec{U}_y = \vec{c}(\vec{x}, \vec{U}). \quad (1)$$

Здесь  $\vec{U} = \{u, v\}$  — вектор неизвестных функций;  $\vec{x} = \{x, y\}$  — вектор независимых переменных;  $A, B$  — матрицы размера  $2 \times 2$ ;  $\vec{c} \in \mathbb{R}^2$ ; коэффициенты матриц  $A, B$  и вектора  $\vec{c}$  являются функциями от  $x, y, u, v$ .

На двух разных кривых  $\phi_1(x, y) = 0$ ,  $\phi_2(x, y) = 0$ , пересекающихся при  $x = x_0, y = y_0$ , ставятся для неизвестных функций два начальных условия:

$$\Phi_1(x, y, u, v)|_{\phi_1(x, y)=0} = 0, \quad \Phi_2(x, y, u, v)|_{\phi_2(x, y)=0} = 0. \quad (2)$$

Здесь  $\phi_1(x, y)$ ,  $\phi_2(x, y)$ ,  $\Phi_1(x, y, u, v)$ ,  $\Phi_2(x, y, u, v)$  — заданные функции своих

аргументов. Константы  $x_0, y_0, u_{00}, v_{00}$  выбираются так, чтобы выполнялись равенства

$$\phi_1(x_0, y_0) = 0, \phi_2(x_0, y_0) = 0, \Phi_1(x_0, y_0, u_{00}, v_{00}) = 0, \Phi_2(x_0, y_0, u_{00}, v_{00}) = 0. \quad (3)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Если выбор констант  $x_0, y_0, u_{00}, v_{00}$  можно осуществить двумя или более способами, т. е. если система (3) имеет больше одного решения, то используется одно из них и вводится дополнительное требование: точка  $(x = x_0, y = y_0, u = u_{00}, v = v_{00})$  должна быть локально единственной, т. е. должна существовать проколота окрестность этой точки, в которой равенства (3) не выполняются.

Задача (1), (2) есть ОЗК с данными на двух поверхностях для двух неизвестных функций. Она в дальнейшем для краткости именуется *задачей А*.

Для того чтобы построить решение задачи А в виде рядов по степеням независимых переменных и доказать их сходимости, удобно преобразовать ее так, чтобы начальные данные для неизвестных функций были, во-первых, заданы на координатных осях, во-вторых, были однородными. С этой целью делаются замены независимых переменных и неизвестных функций.

Вводятся новые независимые переменные  $x', y'$  по формулам

$$x' = \phi_1(x, y), \quad y' = \phi_2(x, y). \quad (4)$$

Якобиан данного преобразования имеет вид  $J_1 = \begin{vmatrix} \phi_{1x} & \phi_{1y} \\ \phi_{2x} & \phi_{2y} \end{vmatrix}$ . Предполагается, что

$$J_1|_{x=x_0, y=y_0} \neq 0, \quad (5)$$

а значит, замена (4) в некоторой окрестности точки  $(x = x_0, y = y_0)$  невырожденная. Геометрический смысл условия (5) состоит в том, что кривые  $\phi_1(x, y) = 0, \phi_2(x, y) = 0$  в точке  $(x = x_0, y = y_0)$  пересекаются, не касаясь друг друга.

После замены (4) кривая  $\phi_1(x, y) = 0$  переходит в координатную ось  $x' = 0$ , кривая  $\phi_2(x, y) = 0$  — в координатную ось  $y' = 0$ , точка  $(x = x_0, y = y_0)$  — в точку  $(x' = 0, y' = 0)$ . Штрих у новых переменных для облегчения написания в дальнейшем опускается, и для системы уравнений сохраняется написание (1).

Для того чтобы было удобнее ввести новые неизвестные функции, выполняются вспомогательные преобразования начальных данных и системы уравнений.

Предполагается, что

$$\Phi_{1u}(0, 0, u_{00}, v_{00}) \neq 0, \quad \Phi_{2v}(0, 0, u_{00}, v_{00}) \neq 0. \quad (6)$$

Если для функций  $\Phi_1(x, y, u, v), \Phi_2(x, y, u, v)$ , имеющих в окрестности точки  $(x = 0, y = 0, u = u_{00}, v = v_{00})$  непрерывные производные по соответствующим переменным, выполняются условия (6), то по теореме о неявной функции начальные условия (2) можно переписать в виде

$$u|_{x=0} = u_0(y, v)|_{x=0}, \quad v|_{y=0} = v_0(x, u)|_{y=0}. \quad (7)$$

Таким образом, предполагается, что в окрестности рассматриваемой точки первое из условий (2) разрешается относительно неизвестной функции  $u$ , а второе — относительно неизвестной функции  $v$ . Из (3) следует, что справедливы равенства

$$u_{00} = u_0|_{x=0, y=0} = u_0(0, v_{00}), \quad v_{00} = v_0|_{x=0, y=0} = v_0(0, u_{00}).$$

Прежде чем делать замену неизвестных функций, уравнения системы (1) удобно разрешить относительно выводящих производных  $u_x, v_y$ . Это возможно при условии

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & b_{12} \\ a_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \Big|_{x=0, y=0, u=u_{00}, v=v_{00}} = (a_{11}b_{22} - b_{12}a_{21})|_{x=0, y=0, u=u_{00}, v=v_{00}} \neq 0, \quad (8)$$

где  $a_{11}, a_{21}$  — элементы 1-го столбца матрицы  $A$ ;  $b_{12}, b_{22}$  — элементы 2-го столбца матрицы  $B$ . Если неравенство (8) выполняется, то систему (1) можно записать в виде

$$\begin{aligned} u_x &= a(x, y, u, v)u_y + b(x, y, u, v)v_x + f(x, y, u, v), \\ v_y &= c(x, y, u, v)u_y + d(x, y, u, v)v_x + g(x, y, u, v). \end{aligned} \quad (9)$$

Введем следующие обозначения:  $A = a(0, 0, u_{00}, v_{00})$ ,  $B = b(0, 0, u_{00}, v_{00})$ ,  $C = c(0, 0, u_{00}, v_{00})$ ,  $D = d(0, 0, u_{00}, v_{00})$ ,  $a, b, c, d$  — константы,

$$\begin{aligned} f_1 &= [a(x, y, u, v) - A]u_y + [b(x, y, u, v) - B]v_x + f, \\ g_1 &= [c(x, y, u, v) - C]u_y + [d(x, y, u, v) - D]v_x + g. \end{aligned} \quad (10)$$

При таких обозначениях система (9) приобретет вид

$$u_x = Au_y + Bv_x + f_1, \quad v_y = Cu_y + Dv_x + g_1, \quad (11)$$

т. е. в системе (9) в точке  $(x = 0, y = 0)$  выделена главная часть.

Теперь сделаем замену неизвестных функций, целью которой, как указано выше, является приведение начальных данных к однородному виду. Новые неизвестные функции  $u', v'$  вводятся по формулам

$$u' = u - u_0(y, v)|_{x=0}, \quad v' = v - v_0(x, u)|_{y=0}. \quad (12)$$

Якобиан замены (12) имеет вид

$$J_2 = \begin{vmatrix} u'_u & u'_v \\ v'_u & v'_v \end{vmatrix} = 1 - u_{0v}(y, v)|_{x=0}v_{0u}(x, u)|_{y=0}.$$

Введем обозначения:

$$\theta = u_{0v}(0, v_{00}), \quad \kappa = v_{0u}(0, u_{00}), \quad \theta, \kappa — \text{постоянные.} \quad (13)$$

Предположим, что

$$J_2|_{x=0, y=0, u=u_{00}, v=v_{00}} = 1 - \theta\kappa \neq 0, \quad (14)$$

следовательно, замена (12) в некоторой окрестности точки  $O(x = 0, y = 0, u = u_{00}, v = v_{00})$  невырожденная. В результате замены (12) начальные условия (7) примут вид

$$u'|_{x=0} = 0, \quad v'|_{y=0} = 0.$$

Выражения старых неизвестных функций  $u, v$  через новые неизвестные функции  $u', v'$  (и независимые переменные  $x, y$ ) имеют вид

$$u = u' + u_0(y, v' + v_{00})|_{x=0}, \quad v = v' + v_0(x, u' + u_{00})|_{y=0}. \quad (15)$$

Положим

$$\begin{aligned} u_1|_{x=0} &= u_{0y}(y, v' + v_{00})|_{x=0} + [u_{0v}(y, v' + v_{00})|_{x=0} - \theta]v'_y|_{x=0}, \\ v_1|_{y=0} &= v_{0x}(x, u' + u_{00})|_{y=0} + [v_{0u}(x, u' + u_{00})|_{y=0} - \kappa]u'_x|_{y=0}. \end{aligned} \quad (16)$$

С учетом обозначений (13), (16) выражения производных старых неизвестных функций  $u, v$  через новые неизвестные функции  $u', v'$  (и независимые переменные) имеют вид

$$\begin{aligned} u_x &= u'_x, & u_y &= u'_y + \theta v'_y|_{x=0} + u_1|_{x=0}, \\ v_y &= v'_y, & v_x &= v'_x + \kappa u'_x|_{y=0} + v_1|_{y=0}. \end{aligned} \tag{17}$$

Соотношения (15), (17) подставим в систему (11). В результате эта система преобразуется к виду

$$\begin{aligned} u_x &= Au_y + Bv_x + A\theta v_y|_{x=0} + B\kappa u_x|_{y=0} + p, \\ v_y &= Cu_y + Dv_x + C\theta v_y|_{x=0} + D\kappa u_x|_{y=0} + q. \end{aligned} \tag{18}$$

где  $p = Au_1|_{x=0} + Bv_1|_{y=0} + f_1$ ,  $q = Cu_1|_{x=0} + Dv_1|_{y=0} + g_1$ . С целью облегчения написания штрих у неизвестных функций  $u, v$  здесь и далее опускается. Из построения функций  $p, q$  следует (см. (10), (16)), что они зависят от независимых переменных  $x, y$ , неизвестных функций  $u, v$  и их первых производных, причем линейны относительно производных  $u_y, v_x, u_x|_{y=0}, v_y|_{x=0}$ , и коэффициенты перед этими производными обращаются в точке  $O(x = 0, y = 0, u = 0, v = 0)$  в нуль.

Как показано выше, начальные данные для системы (18) будут однородными:

$$u(0, y) = 0, \quad v(x, 0) = 0. \tag{19}$$

**ЗАМЕЧАНИЕ 2.** Ранее задача (1), (2) была поставлена в работе С. П. Баутина [9]. Однако в [9] делается замена неизвестных функций, которая возможна, вообще говоря, только в случае, когда начальные условия (2) имеют вид

$$\Phi_1(x, y, u)|_{\phi_1(x,y)=0} = 0, \quad \Phi_2(x, y, v)|_{\phi_2(x,y)=0} = 0.$$

Правые части условий (7) в этом случае зависят только от независимых переменных:

$$u|_{x=0} = u_0(y), \quad v|_{y=0} = v_0(x),$$

а значит,  $\theta = 0, \kappa = 0$ . Таким образом, в настоящей статье исследуется задача А в более общей постановке, чем в статье [9].

**Теорема 1.** Пусть в задаче (18), (19) функции  $p = p(x, y, u, v, u_y, v_x, u_x|_{y=0}, v_y|_{x=0})$ ,  $q = q(x, y, u, v, u_y, v_x, u_x|_{y=0}, v_y|_{x=0})$  обладают следующими свойствами: а) линейны относительно переменных  $u_y, v_x, u_x|_{y=0}, v_y|_{x=0}$ , причем коэффициенты перед этими переменными обращаются в точке  $O(x = 0, y = 0, u = 0, v = 0)$  в нуль; б) аналитичны в некоторой окрестности точки  $O(x = 0, y = 0, u = 0, v = 0)$  по переменным  $x, y, u, v$ .

Положим  $\alpha = AD, \beta = BC, \gamma = 1 + \alpha - \beta$  и

$$\Delta_0^* = \gamma, \quad \Delta_{n+1}^* = \gamma - \frac{\alpha}{\Delta_n^*}, \quad n \in \mathbb{N}_0, \tag{20}$$

$$\Delta_0 = \begin{cases} \frac{(1-C\theta)(1-B\kappa)-\alpha\theta\kappa}{1-\theta\kappa}, & 1-\theta\kappa \neq 0, \\ (1-C\theta)(1-B\kappa)-\alpha\theta\kappa, & 1-\theta\kappa = 0, \end{cases} \quad \Delta_1 = \begin{cases} \gamma - \frac{\alpha}{\Delta_0}, & 1-\theta\kappa \neq 0, \\ \gamma, & 1-\theta\kappa = 0, \end{cases}$$

$$\Delta_{n+1} = \gamma - \frac{\alpha}{\Delta_n}, \quad n \in \mathbb{N}. \tag{21}$$

Если выполняются условия

$$\Delta_n \neq 0, \quad n \in \mathbb{N}_0, \tag{22}$$

$$\Delta_n^* \neq 0, \quad n \in \mathbb{N}_0, \quad (23)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n^* = \Delta_\infty^*, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n = \Delta_\infty, \quad \Delta_\infty^* = \Delta_\infty, \quad 0 < |\Delta_\infty| < +\infty, \quad (24)$$

$$\frac{|\alpha|}{\Delta_\infty^2} < 1, \quad (25)$$

то у задачи (18), (19) существует единственное локально аналитическое решение. При этом условия (22) являются необходимыми и достаточными условиями существования и единственности решения в виде формальных степенных рядов.

**ЗАМЕЧАНИЕ 3.** Выполнение условия  $1 - \theta\kappa \neq 0$ , как показано выше (см. (14)), необходимо для того, чтобы было возможно перейти от задачи (1), (2) к задаче (18), (19), однако задача (18), (19) может иметь аналитическое решение в случае  $1 - \theta\kappa = 0$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1.** Если выполнено условие (25), то с помощью замены независимых переменных  $x' = \varepsilon_1 x$ ,  $y' = \varepsilon_2 y$ ,  $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$  можно добиться (см. [9]) выполнения неравенств

$$|A| < |\Delta_\infty|, \quad |D| < |\Delta_\infty|. \quad (26)$$

В дальнейшем предполагается, что такая замена уже сделана и неравенства (26) выполняются.

Решение задачи (18), (19) строится в виде рядов (символ  $z$  принимает значения  $u, v$ )

$$z(x, y) = \sum_{k, l \in \mathbb{N}_0} \frac{z_{k, l} x^k y^l}{k! l!}, \quad z_{k, l} = \left. \frac{\partial^{k+l} z}{\partial x^k \partial y^l} \right|_{x=y=0}. \quad (27)$$

Пусть

$$r_{k, l} = \left. \frac{\partial^{k+l} r}{\partial x^k \partial y^l} \right|_{\substack{x=y=0, \\ u=v=0}}, \quad \vec{z}_n = (z_{n, 0}; z_{n-1, 1}; \dots; z_{0, n}), \quad \vec{r}_n = (r_{n, 0}; r_{n-1, 1}; \dots; r_{0, n}),$$

где символ  $r$  принимает значения  $p, q$ . Из построения функций  $p, q$  следует, что в  $r_{k, l}$  будут входить компоненты векторов  $\vec{z}_m$  при  $0 \leq m \leq l + k = n$  и не будут входить компоненты векторов  $\vec{z}_m$  при  $m > l + k = n$ .

Возможность однозначного определения коэффициентов рядов (27) доказывается индукцией по  $n = k + l$ . Из начальных условий (19) вытекает, что

$$u_{0, l} = v_{k, 0} = 0, \quad k, l \in \mathbb{N}_0, \quad (28)$$

в частности,  $u_{0, 0} = v_{0, 0} = 0$ ,  $u_{0, 1} = v_{1, 0} = 0$ . Остальные компоненты векторов  $\vec{u}_1, \vec{v}_1$  удовлетворяют системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ):

$$u_{1, 0} = A\theta v_{0, 1} + B\kappa u_{1, 0} + p_{0, 0}, \quad v_{0, 1} = C\theta v_{0, 1} + D\kappa u_{1, 0} + q_{0, 0}, \quad (29)$$

которая получается, если в обеих частях системы (18) положить  $x = y = u = v = 0$  и учесть начальные условия в виде (28) при  $k = 1$  и при  $l = 1$ . Определитель системы (29) равен  $(1 - B\kappa)(1 - C\theta) - AD\theta\kappa$ , т. е. компоненты векторов  $\vec{z}_1$  однозначно определяются тогда и только тогда, когда  $\Delta_0 \neq 0$  (см. (21)).

Пусть все  $\vec{z}_0, \vec{z}_1, \dots, \vec{z}_n$ ,  $n \geq 1$ , найдены. Чтобы найти  $\vec{z}_{n+1}$ , уравнения (18) продифференцируем  $k$  раз по  $x$ ,  $n - k$  раз по  $y$ , положим  $x = y = u = v = 0$  и

учтем начальные условия в виде (28). В результате получим соотношения

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{0,n+1} = 0 \\ v_{0,n+1} = Cu_{0,n+1} + Dv_{1,n} + C\theta v_{0,n+1} + q_{0,n} \\ u_{1,n} = Au_{0,n+1} + Bv_{1,n} + A\theta v_{0,n+1} + p_{0,n} \\ v_{1,n} = Cu_{1,n} + Dv_{2,n-1} + q_{1,n-1} \\ u_{2,n-1} = Au_{1,n} + Bv_{2,n-1} + p_{1,n-1} \\ \dots\dots\dots \\ v_{k,n+1-k} = Cu_{k,n-k+1} + Dv_{k+1,n-k} + q_{k,n-k} \\ u_{k+1,n-k} = Au_{k,n-k+1} + Bv_{k+1,n-k} + p_{k,n-k} \\ \dots\dots\dots \\ v_{n-1,2} = Cu_{n-1,2} + Dv_{n,1} + q_{n-1,1} \\ u_{n,1} = Au_{n-1,2} + Bv_{n,1} + p_{n-1,1} \\ v_{n,1} = Cu_{n,1} + Dv_{n+1,0} + D\kappa u_{n+1,0} + q_{n,0} \\ u_{n+1,0} = Au_{n,1} + Bv_{n+1,0} + B\kappa u_{n+1,0} + p_{n,0} \\ v_{n+1,0} = 0, \end{array} \right. \quad (30)$$

которые являются СЛАУ для компонент векторов  $\vec{u}_{n+1}, \vec{v}_{n+1}$ .

СЛАУ (30) решается методом последовательного исключения неизвестных (методом Гаусса). При этом «прямой ход» состоит в построении величин

$$\mu_0^{(1)} = 1, \quad \mu_0^{(2)} = 1, \quad \mu_1^{(1)} = 1 - C\theta, \quad \mu_1^{(2)} = 1 - B\kappa, \quad (31)$$

$$\mu_{m+1}^\nu = \gamma\mu_m^\nu - \alpha\mu_{m-1}^\nu, \quad \nu = 1, 2, \quad m = 1, \dots, n,$$

$$\lambda_0^{(1)} = \theta, \quad \lambda_0^{(2)} = \kappa, \quad \lambda_1^{(1)} = B(1 - C\theta) + \alpha\theta, \quad \lambda_1^{(2)} = C(1 - B\kappa) + \alpha\kappa,$$

$$\lambda_{m+1}^\nu = \gamma\lambda_m^\nu - \alpha\lambda_{m-1}^\nu, \quad \nu = 1, 2, \quad m = 1, \dots, n. \quad (32)$$

$$\mu_0 = 1 - \theta\kappa, \quad \mu_1 = (1 - C\theta)(1 - B\kappa) - \alpha\theta\kappa, \quad \mu_{m+1} = \gamma\mu_m - \alpha\mu_{m-1}, \quad m = 1, \dots, n. \quad (33)$$

«Обратный ход» состоит в построении величин

$$u_{0,n+1} = 0,$$

$$u_{k+1,n-k} = \frac{1}{\mu_{n+1}} \left[ \mu_{n-k}^{(2)} \sum_{i=0}^k A^{k-i} (A\lambda_i^{(1)} q_{i,n-i} + \mu_{i+1}^{(1)} p_{i,n-i}) \right. \\ \left. + \lambda_{k+1}^{(1)} \sum_{i=k+1}^n D^{i-k-1} (\mu_{n+1-i}^{(2)} q_{i,n-i} + D\lambda_{n-i}^{(2)} p_{i,n-i}) \right], \quad k = 0, 1, \dots, n-1, \quad (34)$$

$$u_{n+1,0} = \frac{1}{\mu_{n+1}} \left[ \sum_{i=0}^n A^{n-i} (A\lambda_i^{(1)} q_{i,n-i} + \mu_{i+1}^{(1)} p_{i,n-i}) \right]; \quad (35)$$

$$v_{n+1,0} = 0,$$

$$v_{n-k,k+1} = \frac{1}{\mu_{n+1}} \left[ \mu_{n-k}^{(1)} \sum_{i=0}^k D^{k-i} (D\lambda_i^{(2)} p_{n-i,i} + \mu_{i+1}^{(2)} q_{n-i,i}) \right. \\ \left. + \lambda_{k+1}^{(2)} \sum_{i=k+1}^n A^{i-k-1} (\mu_{n+1-i}^{(1)} p_{n-i,i} + A\lambda_{n-i}^{(1)} q_{n-i,i}) \right], \quad k = 0, 1, \dots, n-1, \quad (36)$$

$$v_{0,n+1} = \frac{1}{\mu_{n+1}} \left[ \sum_{i=0}^n D^{n-i} (D\lambda_i^{(2)} p_{n-i,i} + \mu_{i+1}^{(2)} q_{n-i,i}) \right]. \quad (37)$$

**Лемма 1.** Пусть

$$\Delta_{00} = \begin{cases} 1 - \theta\kappa, & \text{если } 1 - \theta\kappa \neq 0, \\ 1, & \text{если } 1 - \theta\kappa = 0. \end{cases}$$

Если  $\Delta_i \neq 0$ ,  $i = 0, 1, \dots, n-1$ , то справедливо равенство

$$\mu_n = \Delta_{00} \prod_{i=0}^{n-1} \Delta_i, \quad (38)$$

здесь  $\Delta_i$  определяются по формулам (21).

Доказательство леммы проводится индукцией по  $n$  и не приводится.

**Следствие.** Условия  $\mu_n \neq 0$  выполнены при всех  $n \in \mathbb{N}$  тогда и только тогда, когда при всех  $n \in \mathbb{N}_0$  выполнены условия (22):  $\Delta_n \neq 0$ .

Таким образом, условия (22) — необходимые и достаточные условия однозначной разрешимости СЛАУ (30). При этом для нахождения  $\vec{u}_1, \vec{v}_1$  надо требовать выполнения условия  $\mu_1 = \Delta_{00}\Delta_0 \neq 0$ , для нахождения  $\vec{u}_2, \vec{v}_2$  — выполнения условия  $\mu_2 = \Delta_{00}\Delta_0\Delta_1 \neq 0$ , для нахождения  $\vec{u}_3, \vec{v}_3$  — неравенства  $\mu_3 = \Delta_{00}\Delta_0\Delta_1\Delta_2 \neq 0$ . Вообще, при переходе от нахождения  $\vec{u}_n, \vec{v}_n$  к нахождению  $\vec{u}_{n+1}, \vec{v}_{n+1}$  к ранее указанным условиям:  $\Delta_0 \neq 0, \Delta_1 \neq 0, \dots, \Delta_{n-1} \neq 0$  ( $\Delta_{00} \neq 0$  по определению), добавляется условие  $\Delta_n \neq 0$ .

Итак, индукцией по  $n$  доказано, что условия (22) суть необходимые и достаточные условия существования и единственности коэффициентов рядов (27), которые можно найти по формулам (34)–(37).

Для доказательства сходимости рядов (27) используется следующее вспомогательное утверждение.

**Лемма 2.** Пусть последовательность  $\{\mu_n\}$  определяется из (33) и обладает свойством (38). Если выполнены условия (22)–(25) теоремы 1, то найдутся константы  $M > 0$ ,  $0 < q_* < 1$  такие, что при всех  $i, j, k \in \mathbb{N}_0$  выполнены неравенства

$$\left| \frac{E^k \pi_i^{(1)} \pi_j^{(2)}}{\mu_{i+j+k}} \right| < M q_*^k.$$

Здесь символ  $E$  принимает значения  $A, D$ , символ  $\pi$  — значения  $\mu, \lambda$ .

Доказательство леммы опирается на соотношения (23)–(26) и лемму 1, весьма громоздко и здесь не приводится.

Сходимость рядов (27) доказывается классическим методом мажорант.

Для задачи (18), (19) мажорантная задача строится следующим образом. Вначале выбираются положительные константы  $M_1, \rho$  такие, что функция

$$R = \frac{M_1}{\left[1 - \frac{(x+y+U+V)}{\rho}\right]} [(x+y+U+V)(U_y + V_x + U_x + V_y) + 1]$$

мажорирует функции  $p, q$  ( $R \gg p, q$ ). Это возможно при условии  $U_{k,l} \geq |u_{k,l}|$ ,  $V_{k,l} \geq |v_{k,l}|$ ,  $k, l \in \mathbb{N}_0$ , в силу аналитичности функций  $a, b, c, d, f, g, u_0, v_0$ .

Пусть

$$R_{k,l} = \frac{\partial^{k+l} R}{\partial x^k \partial y^l} \Bigg|_{\substack{x=y=0, \\ U=V=0}}.$$

Далее строятся константы  $U_{k,l}$ ,  $V_{k,l}$  и индукцией по  $n = k + l$  доказывается, что  $|U_{k,l}| \geq |u_{k,l}|$ ,  $|V_{k,l}| \geq |v_{k,l}|$ ,

$$V_{1,0} = U_{0,1} = 0, \quad V_{0,1} = U_{1,0} = R_{0,0},$$

из построения функции  $R$  вытекает, что  $|V_{0,1}| \geq |v_{0,1}|$ ,  $|U_{1,0}| \geq |u_{1,0}|$ .

Пусть  $U_{k,l} \geq |u_{k,l}|$ ,  $V_{k,l} \geq |v_{k,l}|$ ,  $k + l = m$ , при  $m = 1, \dots, n$  и

$$U_{0,n+1} = 0,$$

$$U_{k+1,n-k} = M(q_* + 1) \left( \sum_{i=0}^k Mq_*^{k-i} R_{i,n-i} + \sum_{i=k+1}^n q_*^{i-k-1} R_{i,n-i} \right), \quad k = 0, \dots, n-1,$$

$$U_{n+1,0} = M(q_* + 1) \sum_{i=0}^n Mq_*^{n-i} R_{i,n-i};$$

$$V_{n+1,0} = 0,$$

$$V_{n-k,k+1} = M(q_* + 1) \left( \sum_{i=0}^k Mq_*^{k-i} R_{n-i,i} + \sum_{i=k+1}^n q_*^{i-k-1} R_{n-i,i} \right), \quad k = 0, \dots, n-1,$$

$$V_{0,n+1} = M(q_* + 1) \sum_{i=0}^n Mq_*^{n-i} R_{n-i,i}.$$

Из построения функции  $R$ , леммы 2 и предположения индукции следует, что можно подобрать константы  $M > 0$ ,  $0 < q_* < 1$  таким образом, чтобы выполнялись неравенства  $V_{k,l} \geq |v_{k,l}|$ ,  $U_{k,l} \geq |u_{k,l}|$ ,  $k + l = n$ . Следовательно,

$$U(x, y) = \sum_{k,l \in \mathbb{N}_0} \frac{U_{k,l} x^k y^l}{k!l!} \gg u(x, y), \quad V(x, y) = \sum_{k,l \in \mathbb{N}_0} \frac{V_{k,l} x^k y^l}{k!l!} \gg v(x, y). \quad (39)$$

Далее доказывается сходимость рядов (39). Строятся константы  $W_n$  по формулам

$$W_0 = 0, \quad W_1 = V_{1,0} = U_{0,1} = R_0^* > U_{0,1} = V_{1,0} = 0, \quad W_{n+1} = R_n^*, \quad n = 1, 2, \dots,$$

где

$$R^* = \frac{M_1 M_2}{\left[1 - \frac{(t+2W)}{\rho}\right]} [(t + 2W)4W_t + 1], \quad R_n^* = \left. \frac{d^n R^*}{dt^n} \right|_{t=W=0}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$M_2 = \frac{2M(q_* + 1)}{1 - q_*} > M(q_* + 1) \left( \sum_{i=0}^k q_*^{k-i} + \sum_{i=k+1}^n q_*^{i-k-1} \right) > M(q_* + 1) \sum_{i=0}^n q_*^{n-i}.$$

Тогда  $W_n \geq \max_{k+l=n} \{U_{k,l}; V_{k,l}\}$ .

Построение коэффициентов рядов  $\sum_{n \in \mathbb{N}_0} W_n t^n / n!$  по изложенной процедуре равносильно решению ЗК:

$$W_t = \frac{M_2 M_1}{\left[1 - \frac{(t+2W)}{\rho}\right]} [(t + 2W)4W_t + 1], \quad W(0) = 0. \quad (40)$$

Если задачу (40) записать в нормальном виде:

$$W_t = G_1(t, W), \quad W(0) = 0, \quad (41)$$

где

$$G_1 = \frac{M_3}{1 - \left[ \frac{(t+2W)}{\rho} + 4M_3(t+2W) \right]}, \quad M_3 = M_1 M_2,$$

то правая часть дифференциального уравнения — функция  $G_1(t, W)$  — является аналитической в окрестности точки  $(t = 0, W = 0)$  функцией, мажорирующей нуль.

По теореме Ковалевской задача (41) имеет единственное аналитическое мажорирующее нуль решение. Из способа построения задачи следует, что функция  $W(x+y)$  мажорирует функции  $U(x, y)$ ,  $V(x, y)$  (см. (39)), а значит, задача (41) является мажорантной для задачи (18), (19) и  $W(x+y) \gg u(x, y), v(x, y)$ .

Теорема 1 доказана.

Теперь сформулируем теорему, устанавливающую удобные для проверки достаточные условия существования формального решения и достаточные условия аналитической разрешимости задачи (18), (19).

Положим  $\Delta_+ = \frac{1}{2}(\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 4\alpha})$ ,  $\Delta_- = \frac{1}{2}(\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4\alpha})$ . Значения  $\Delta_{\pm}$  являются корнями уравнения  $\Delta = \gamma - \frac{\alpha}{\Delta}$ . Через  $\Delta_{\max}$  обозначается то из значений  $\Delta_+$ ,  $\Delta_-$ , модуль которого больше, а через  $\Delta_{\min}$  — то из значений, модуль которого меньше. Если  $\gamma^2 - 4\alpha = 0$ , то  $\Delta_{\max} = \Delta_{\min}$ .

**Теорема 2** (достаточные условия существования формального решения и достаточные условия аналитической разрешимости задачи (18), (19)). 1. Пусть

$$\gamma \neq 0, \quad \gamma^2 - 4\alpha \geq 0, \quad \mu_0 \neq 0, \quad \Delta_0 \neq 0, \quad \Delta_0 \notin \Lambda(\alpha, \gamma). \quad (42)$$

Тогда задача (18), (19) имеет единственное формальное решение в виде рядов по степеням  $x, y$ . При этом

1.1) если  $\gamma > 0, \alpha > 0$ , то  $\Lambda(\alpha, \gamma) = \left[ \frac{\alpha}{\gamma}; \Delta_{\min} \right)$ ,

1.2) если  $\gamma < 0, \alpha > 0$ , то  $\Lambda(\alpha, \gamma) = \left( \Delta_{\min}; \frac{\alpha}{\gamma} \right]$ ,

1.3) если  $\gamma < 0, \alpha < 0$ , то  $\Lambda(\alpha, \gamma) = \left[ \frac{\gamma\alpha}{\gamma^2 - \alpha}; \frac{\alpha}{\gamma} \right]$ ,

1.4) если  $\gamma > 0, \alpha < 0$ , то  $\Lambda(\alpha, \gamma) = \left[ \frac{\alpha}{\gamma}; \frac{\gamma\alpha}{\gamma^2 - \alpha} \right]$ ,

1.5) если  $\gamma \neq 0, \alpha = 0$ , то  $\Lambda(\alpha, \gamma) = \{0\}$ .

2. Пусть

$$\gamma \neq 0, \quad \gamma^2 - 4\alpha \geq 0, \quad \mu_0 = 0, \quad \Delta_0 \neq 0. \quad (43)$$

Тогда задача (18), (19) имеет единственное формальное решение в виде рядов по степеням  $x, y$ .

3. Пусть

$$\gamma = 0, \quad \alpha \neq 0, \quad \Delta_0 \neq 0. \quad (44)$$

Тогда задача (18), (19) имеет единственное формальное решение в виде рядов по степеням  $x, y$ .

4. Пусть  $\Delta_n \neq 0$ ;

$$\gamma \neq 0, \quad \gamma^2 - 4\alpha > 0, \quad \Delta_0 \neq \Delta_{\min}. \quad (45)$$

Тогда задача (18), (19) имеет единственное аналитическое решение в некоторой окрестности точки  $(x = 0, y = 0)$ .

Доказательство теоремы 2 проводится сведением к теореме 1 и здесь не приводится.

**Следствие.** Пусть выполнены условие (45) и любое из условий (42)–(44). Тогда задача (18), (19) имеет единственное локально аналитическое решение в некоторой окрестности точки  $(x = 0, y = 0)$ .

ЗАМЕЧАНИЕ 4. Множество  $\Lambda(\alpha, \gamma)$  при  $\alpha \neq 0$  всегда лежит по одну сторону от нуля.

ЗАМЕЧАНИЕ 5. Если  $\gamma^2 - 4\alpha = 0$ , то  $\Delta_{\max}^2 = \Delta_{\min}^2 = \gamma^2/4 = \alpha$  и достаточное условие (25) сходимости рядов не выполняется.

ЗАМЕЧАНИЕ 6. В случае 3:  $\gamma = 0, \alpha \neq 0, \Delta_0 \neq 0$ , условие  $\gamma^2 - 4\alpha \geq 0$  не используется.

ЗАМЕЧАНИЕ 7. Если  $\theta = \kappa = 0$ , то для всех точек из областей  $\Omega_1$ – $\Omega_5$ , описанных в работе [9], справедливо одно из условий (42)–(44).

Далее приводятся две теоремы существования и единственности локально аналитического решения задачи (18), (19) в случае, когда достаточные условия (23)–(25) сходимости рядов (27) не выполняются и система (18) полулинейна: коэффициенты перед производными неизвестных функций являются константами, а функции  $p, q$  зависят от неизвестных функций  $u, v$  и независимых переменных  $x, y$ .

**Теорема 3.** Рассмотрим задачу

$$\begin{aligned} u_x &= Au_y + Bv_x + A\theta v_y|_{x=0} + B\kappa u_x|_{y=0} + p(x, y, u, v), \\ v_y &= Cu_y + Dv_x + C\theta v_y|_{x=0} + D\kappa u_x|_{y=0} + q(x, y, u, v), \\ u(0, y) &= 0, \quad v(x, 0) = 0. \end{aligned} \tag{46}$$

Пусть функции  $p(x, y, u, v), q(x, y, u, v)$  являются аналитическими в некоторой окрестности точки  $O(x = 0, y = 0, u = 0, v = 0)$ .

Если выполняются условия

$$\begin{aligned} \alpha &= AD \neq 0, \quad \gamma = 1 + AD - BC = 0, \\ \mu_0 &= 1 - \theta\kappa \neq 0, \quad \mu_1 = (1 - C\theta)(1 - B\kappa) - \alpha\theta\kappa \neq 0, \end{aligned}$$

то задача (46) в некоторой окрестности точки  $(x = 0, y = 0)$  имеет единственное аналитическое решение.

Для задачи (46) не выполняются условия (23), так как  $\Delta_0^* = \gamma = 0$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Легко убедиться (см. (31)–(33)), что при выполнении условий данной теоремы справедливы равенства

$$\pi_{2n} = \pi_0(-\alpha)^n, \quad \pi_{2n+1} = \pi_1(-\alpha)^n, \quad n \in \mathbb{N}_0, \tag{47}$$

где символ  $\pi$  принимает значения  $\mu^{(1)}, \mu^{(2)}, \mu, \lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$ . Из соотношений (47) и условия теоремы, в частности, следует, что  $\mu_n \neq 0$ , т. е. выполнены условия (22) (см. следствие из леммы 1), и у задачи (46) по теореме 1 существует формальное решение в виде рядов по степеням  $x$  и  $y$ . Коэффициенты рядов строятся по формулам (34)–(37).

Коэффициенты мажорантного ряда строятся по формулам

$$W_0 = 0, \quad W_1 = R_0^*, \quad W_{n+1} = (n + 1)R_n^*, \quad n = 1, 2, \dots,$$

где

$$R^* = \frac{M_*}{1 - \frac{(t+2W)}{\rho}}, \quad R_n^* = \left. \frac{d^n R^*}{dt^n} \right|_{t=W=0}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

что равносильно решению ЗК:

$$W_t = tR_t^* + R^*, \quad W(0) = 0.$$

Если последнюю задачу записать в нормальном виде:

$$W_t = G_3(t, W), \quad W(0) = 0, \quad (48)$$

где

$$G_3 = \frac{R^*(1 + tG_2)}{1 - 2tR^*G_2}, \quad G_2 = \frac{1}{\rho - t - 2W},$$

то правая часть дифференциального уравнения — функция  $G_3(t, W)$  — является аналитической в окрестности точки  $(t = 0, W = 0)$  функцией, мажорирующей нуль. По теореме Ковалевской задача (48) имеет единственное аналитическое мажорирующее нуль решение. Теорема 3 доказана.

**ЗАМЕЧАНИЕ 8.** Теорема 3 справедлива как в случае  $\gamma = 0, \alpha < 0$ , а значит,  $\gamma^2 - 4\alpha > 0$ , так и в случае  $\gamma = 0, \alpha > 0$ , а значит,  $\gamma^2 - 4\alpha < 0$ .

**Теорема 4.** Если функции  $p(x, y, u, v), q(x, y, u, v)$  аналитические в некоторой окрестности точки  $O(x = 0, y = 0, u = 0, v = 0), 1 - \theta\kappa \neq 0$ , то задача

$$\begin{aligned} u_x &= u_y + \theta v_y|_{x=0} + p(x, y, u, v), & v_y &= v_x + \kappa u_x|_{y=0} + q(x, y, u, v), \\ u(0, y) &= 0, & v(x, 0) &= 0, \end{aligned} \quad (49)$$

в некоторой окрестности точки  $(x = 0, y = 0)$  имеет единственное аналитическое решение.

Для задачи (49) справедливы равенства  $\Delta_\infty = \alpha = 1$ , т. е. не выполняется условие (25).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО теоремы 4 проводится аналогично доказательству теоремы 3 и здесь не приводится.

Далее приведены пять контрпримеров для задачи А. Контрпример 1 показывает, что сформулировать для задачи А, как и для задачи Коши, необходимые и достаточные условия существования аналитического решения невозможно. Контрпримеры 2–4 показывают, что при существовании у задачи А формального решения в виде степенных рядов (рядов (27)) аналитическое решение задачи тем не менее может отсутствовать, так как ряды сходятся только в точке  $(x = 0, y = 0)$ . Для контрпримеров 2–4 справедливы условия существования и единственности формального решения (22), но не выполняется одно из достаточных условий сходимости (23)–(25). Для контрпримера 2  $\Delta_0 = \Delta_{\min}$ , т. е. не выполняются условия (45), вследствие этого  $\Delta_\infty \neq \Delta_\infty^*, \frac{|\alpha|}{\Delta_\infty^2} > 1$ , т. е. не выполняются условия (24) и (25). Для контрпримеров 3 и 4  $\gamma^2 - 4\alpha = 0$ , т. е. не выполняются условия (45), вследствие этого  $\frac{|\alpha|}{\Delta_\infty^2} = 1$ , т. е. не выполняется условие (25). Контрпример 5 показывает, что наличие в системе (18) слагаемых, содержащих выводящие производные неизвестных функций, заданные на координатных осях, существенным образом отличает задачу (18), (19), рассмотренную в данной работе, от задачи, рассмотренной в работе [9], где  $\theta = \kappa = 0$ .

**КОНТРИПРИМЕР 1.** Для любых значений  $A, B, C, D, \theta, \kappa$  и любых аналитических в окрестности точки  $(x = 0, y = 0)$  функций  $u^0(x, y), v^0(x, y)$  если функции  $p, q$  взять в виде

$$p = u^0 + xu_x^0 - Axu_y^0 - B y v_x^0 - A\theta(v^0 + yv_y^0)|_{x=0} - B\kappa(u^0 + xu_x^0)|_{y=0},$$

$$q = u^0 + yv_y^0 - Cxu_y^0 - Dyv_x^0 - C\theta(v^0 + yv_y^0)|_{x=0} - D\kappa(u^0 + xu_x^0)|_{y=0},$$

то у задачи (18), (19) существует аналитическое решение  $u = xu^0(x, y)$ ,  $v = yv^0(x, y)$ .

ОБОСНОВАНИЕ КОНТРПРИМЕРА проводится прямой подстановкой функций  $u, v, p, q$  в систему (18).

КОНТРПРИМЕР 2. Задача

$$u_x = Mu_y + v + 1, \quad v_y = v_x + u + 1, \quad u(0, y) = 0, \quad v(x, 0) = 0,$$

где  $M = \text{const} > 1$ , имеет единственное решение в виде формальных степенных рядов, которые сходятся только в точке  $(x = 0, y = 0)$ .

ОБОСНОВАНИЕ КОНТРПРИМЕРА. С использованием формул (34)–(37) индукцией по  $n$  устанавливается, что при всех  $n \geq 2$  справедливо неравенство  $u_{n+1,0} > M^n u_{n-1,0} > 0$ , и поэтому формальный степенной ряд для  $u(x, y)$  расходится при  $x \neq 0$ . Аналогично устанавливается расходимость ряда для  $v(x, y)$  при  $y \neq 0$ .

ЗАМЕЧАНИЕ 9. Идея, лежащая в основе контрпримера 2, та же, что лежит в основе контрпримера 2 из работы [9], однако функции  $p, q$  имеют в настоящей работе более простой вид.

КОНТРПРИМЕР 3. Задача

$$u_x = u_y + \theta v_y|_{x=0} + yv_y + xv_x + v + 1, \quad v_y = v_x + \kappa u_x|_{y=0} + xu_x + yu_y + u + 1, \\ u(0, y) = 0, \quad v(x, 0) = 0, \tag{50}$$

где  $\theta \geq 0, \kappa \geq 0, 1 - \theta\kappa \neq 0$ , имеет единственное решение в виде формальных степенных рядов, которые сходятся только в точке  $(x = 0, y = 0)$ .

ОБОСНОВАНИЕ КОНТРПРИМЕРА. С использованием формул (34)–(37) индукцией по  $n$  устанавливается, что при всех  $n \geq 2$  справедливо неравенство  $|u_{n+1,0}| > n^3 |u_{n-1,0}| > 0$ . Отсюда следует расходимость ряда  $u(x, y)$  при  $x \neq 0$ . Аналогично устанавливается расходимость ряда  $v(x, y)$  при  $y \neq 0$ .

ЗАМЕЧАНИЕ 10. Задача (50) из контрпримера 3 в главной части совпадает с задачей (49), для которой доказана теорема 4, однако система в задаче (50) не является полулинейной. Таким образом, контрпример 3 показывает, что условие полулинейности системы в теореме 4 существенно.

КОНТРПРИМЕР 4. Задача

$$u_x = u_y + \varepsilon v_x + \theta v_y|_{x=0} + u + 1 - \theta, \quad v_y = v_x + u + 1, \\ u(0, y) = 0, \quad v(x, 0) = 0,$$

где  $\varepsilon = \text{const} > 0, \theta = \text{const}, \theta + \varepsilon > 0$ , имеет единственное решение в виде формальных степенных рядов, которые сходятся только в точке  $(x = 0, y = 0)$ .

ОБОСНОВАНИЕ КОНТРПРИМЕРА. С использованием формул (34)–(37) индукцией по  $n$  устанавливается, что при всех  $n \geq 2$  справедливы неравенства

$$u_{n+1,0} = \sum_{i=0}^n (\theta + i\varepsilon + 1)u_{i,n-i} > \sum_{i=0}^n (\theta + i\varepsilon + 1)(\theta + i\varepsilon)u_{n-1,0} > u_{n-1,0}L \sum_{i=1}^n i^2 > 0,$$

где  $L = \min\{\varepsilon^2, (\varepsilon + \theta)^2\} > 0$ . Отсюда с учетом неравенства  $\sum_{i=1}^n i^2 > \frac{n^3}{3}$  следует, что

$$u_{n+1,0} > \frac{Ln^3}{3} u_{n-1,0} > 0,$$

а значит, ряд для  $u(x, y)$  расходится при  $x \neq 0$ . Аналогично доказывается, что ряд для  $v(x, y)$  расходится при  $y \neq 0$ .

Наличие в системе (18) слагаемых, содержащих выводящие производные неизвестных функций, заданные на координатных осях, существенно меняет задачу (18), (19) по сравнению с задачей, рассмотренной в работе [9], где  $\theta = \kappa = 0$ . При надлежащем выборе констант  $\theta$ ,  $\kappa$  в задаче (18), (19) ряды (27) расходятся или формальное решение задачи в виде рядов вообще невозможно построить. В самом деле, справедлив следующий

КОНТРПРИМЕР 5. Рассматривается задача

$$\begin{aligned} u_x = Mu_y + M\theta v_y|_{x=0} + v + 1, \quad v_y = v_x + \kappa u_x|_{y=0} + u + 1, \\ u(0, y) = 0, \quad v(x, 0) = 0, \end{aligned} \quad (51)$$

где  $M, \theta, \kappa = \text{const}$ .

1. Если  $M \neq 1$ ,  $\theta\kappa \neq 0$ ,  $\theta\kappa \neq \frac{1}{M^n}$  при всех  $n \in \mathbb{N}_0$ , то у задачи (51) существует единственное локально аналитическое решение.

2. Если  $\theta\kappa = \frac{1}{M^n}$ , где  $n \in \mathbb{N}_0$ , то построить решение задачи (51) в виде степенных рядов невозможно.

3. Если  $M = \text{const} > 1$ ,  $\theta = \kappa = 0$ , то задача (51) имеет единственное решение в виде формальных степенных рядов, которые сходятся только в точке  $(x = 0, y = 0)$ .

ОБОСНОВАНИЕ КОНТРПРИМЕРА. Как легко убедиться, для данного контр-примера справедливы равенства

$$\gamma = M + 1, \quad \alpha = M, \quad \gamma^2 - 4\alpha = (1 - M)^2 > 0, \quad \Delta_n = \frac{1 - M^{n+1}\theta\kappa}{1 - M^n\theta\kappa}, \quad n \in \mathbb{N}_0. \quad (52)$$

1. В данном случае обоснование контрпримера проводится сведением к теореме 2. Так как  $M \neq 1$ ,  $\theta\kappa \neq 0$ ,  $\theta\kappa \neq \frac{1}{M^n}$ , из (52) следует, что  $\Delta_n \neq 0$ ,  $\Delta_n \neq \Delta_{\pm} = \frac{1}{2}(M + 1 \pm |M - 1|)$ . Таким образом, по теореме 2 у задачи (51) существует в данном случае единственное локально аналитическое решение.

2. Из (52) вытекает, что условия (22) в данном случае не выполняются.

3. В данном случае контрпример 5 совпадает с контрпримером 2.

Автор признателен С. П. Баутину за полезные обсуждения.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Riquier C. Les systemes d'equations aux derivees partielles. Paris: Gauthier-Villars, 1910.
2. Фиников С. П. Метод внешних форм Картана в дифференциальной геометрии. М.; Л.: ОГИЗ, 1948.
3. Гюнтер Н. М. Об аналитических решениях уравнения  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = f(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2})$  // Мат. сб. 1925. Т. 32. С. 26–42.
4. Гюнтер Н. М. О распространении теоремы Коши на любую систему уравнений в частных производных // Мат. сб. 1925. Т. 32. С. 367–447.
5. Соболев С. Л. Об аналитических решениях систем уравнений в частных производных с двумя независимыми переменными // Мат. сб. 1931. Т. 38, № 1–2. С. 107–147.
6. Соболев С. Л. К вопросу об аналитических решениях систем уравнений в частных производных с двумя независимыми переменными // Тр. физ.-мат. ин-та им. В. А. Стеклова. 1934. Т. 5. С. 265–282.
7. Леднев Н. А. Новый метод решения дифференциальных уравнений с частными производными // Мат. сб. 1948. Т. 2. С. 205–266.
8. Баутин С. П. Задача Коши с начальными данными на разных поверхностях // Докл. РАН. 1995. Т. 345, № 5. С. 586–589.

9. Баутин С. П. Задача Коши с начальными данными на разных поверхностях для квазилинейной аналитической системы // Дифференц. уравнения. 1996. Т. 32, № 6. С. 804–813.
10. Баутин С. П., Казаков А. Л. Одна задача Коши с начальными данными на разных поверхностях для системы с особенностью // Изв. вузов. Математика. 1997. № 10. С. 13–23.
11. Тешуков В. М. Распад произвольного разрыва на криволинейной поверхности // Прикл. механика и техн. физика. 1980. № 2. С. 126–133.
12. Тешуков В. М. Построение фронта ударной волны в пространственной задаче о поршне // Динамика сплошной среды. 1978. № 33. С. 114–133.
13. Тешуков В. М. О регулярном отражении ударной волны от жесткой стенки // Прикл. математика и механика. 1982. Т. 46, № 2. С. 225–234.
14. Тешуков В. М. Пространственное взаимодействие сильных разрывов в газе // Прикл. математика и механика. 1986. Т. 50, № 4. С. 225–234.
15. Баутин С. П., Казаков А. Л. Течения газа с ударными волнами, расходящимися от оси или центра симметрии с конечной скоростью // Прикл. математика и механика. 1996. Т. 60, № 3. С. 465–474.
16. Казаков А. Л. Построение кусочно аналитических течений газа, состыкованных через ударные волны, вблизи оси или центра симметрии // Прикл. механика и техн. физика. 1998. Т. 39, № 5. С. 25–38.
17. Баутин С. П. Аналитическая тепловая волна. М.: Физматлит, 2003.

*Статья поступила 5 мая 2004 г.*

*Казаков Александр Леонидович*

*Уральский гос. университет путей сообщения, кафедра прикладной математики,  
ул. Колмогорова, 66, Екатеринбург 620034*

*AKazakov@math.usurt.ru*